

Immunization Requirements

Students are required to show proof of immunizations including the month/date/year. Failure to provide the information will result in the child's exclusion from school.

Preschool/Early Childhood

- DPT – 4 doses
- Polio – 3 doses
- Hib – 1 dose after 15 months (or a completed series by 12 months)
- MMR – 1 dose after 12 months
- Varicella – 1 dose after 12 months
- Hepatitis B – 3 doses (third dose after 6 months of age)
- Pneumococcal – Primary series, or proof of 1 dose after 24 months

Kindergarten

- DPT – 4 doses (last dose after 4 years of age)
- Polio – 4 doses (last dose after 4 years of age)
- MMR – 2 doses after 12 months of age
- Varicella – 2 doses after 12 months of age

1st – 5th Grade

- DPT – 4 doses (last dose after 4 years of age)
- Polio – 3 doses (last dose after 4 years of age) – IPV/OPV mixed will need 4 doses
- MMR – 2 doses after 12 months of age
- Varicella – 2 doses after 12 months of age

6th – 8th Grade

- Tdap – 1 dose
- DPT – 4 doses (last dose after 4 years of age)
- Polio – 3 doses (last dose after 4 years of age) – IPV/OPV mixed will need 4 doses
- MMR – 2 doses after 12 months of age
- Varicella – 2 doses after 12 months of age
- Meningococcal – **1 dose on or after 11th birthday**
- Hepatitis B – 3 doses

Requisitos de Inmunizaciones

Se requiere que los estudiantes muestren prueba de inmunizaciones incluyendo el mes/fecha/año. Falta de proporcionar la información resultará en la exclusión del niño/a de la escuela.

Preescolar / Primera Infancia

- DPT - 4 dosis
- Polio - 3 dosis
- Hib: 1 dosis después de 15 meses (o una serie completa antes de 12 meses)
- MMR - 1 dosis después de 12 meses
- Varicela - 1 dosis después de 12 meses
- Hepatitis B - 3 dosis (tercera dosis después de los 6 meses de edad)
- Neumococo: Serie primaria o prueba de 1 dosis después de 24 meses

Kínder

- DPT - 4 dosis (última dosis después de los 4 años de edad)
- Polio - 4 dosis (última dosis después de los 4 años de edad)
- MMR - 2 dosis después de los 12 meses de edad
- Varicela - 2 dosis después de los 12 meses de edad

1° - 5° Grado

- DPT - 4 dosis (última dosis después de los 4 años de edad)
- Polio: 3 dosis (la última dosis después de los 4 años de edad): Combinación de IPV/OPV necesitará 4 dosis
- MMR - 2 dosis después de los 12 meses de edad
- Varicela - 2 dosis después de los 12 meses de edad

6° - 8° grado

- Tdap - 1 dosis
- DPT - 4 dosis (última dosis después de los 4 años de edad)
- Polio - 3 dosis (la última dosis después de los 4 años de edad): Combinación de IPV/OPV necesitará 4 dosis
- MMR - 2 dosis después de los 12 meses de edad
- Varicela - 2 dosis después de los 12 meses de edad
- Meningococo: 1 dosis a partir de los 11 años de edad o después
- Hepatitis B - 3 dosis